

RapsoBoost

JŪROS DUMBLIŲ EKSTRAKTAS SU BORU (B) IR MOLIBDENU (MO)
SEAWEED EXTRACT WITH BORON (B) AND MOLYBDENUM (MO)



Naturamer RapsoBoost

JŪROS DUMBLIŲ EKSTRAKTAS SU BORU (B) IR MOLIBDENU (MO)

Tręšimui per lapus

PFK: 1(B)(II) SKYSTOSIOS ORGANINĖS – MINERALINĖS TRAŠOS
Deklaruojamų maisto medžiagų kiekis masės procentine dalimi:

Sausoji medžiaga		
(iš 100% <i>Ascophyllum nodosum</i> natūralus ekstrakto)	3,0%	38,4 g/l
Suminis azotas (N)	3,6%	46,1 g/l
Organinis azotas (N)	3,6%	46,1 g/l
Boras (B), kaip boro etanolaminas, vandenyje tirpus	8,7%	111 g/l
Molibdenas (Mo), kaip natrio druska, vandenyje tirpus	0,8%	10,1 g/l
Organinė anglis (C org)	6,1%	78,1 g/l

Sudėtyje taip pat yra manitolio, organinių junginių, polifenolių ir alginatų.

TIK PROFESIONALAMS

LT SUDEDAMOSIOS DALYS:

SMK 1: Cheminės medžiagos ir mišiniai iš grynųjų medžiagų: Boro etanolaminas (CAS Nr. 26038-87-9; EC Nr. 701-024-0), Natrio molibdatas 2 – hidratas (CAS Nr. 12054-85-2, EC. Nr. 263-031-3), SMK 2: Augalai, augalų dalys arba augalų ekstraktai: šalto spaudimo 100% natūralus *Ascophyllum nodosum* dumblių ekstraktas (CAS Nr. 84775-78-0).

Pirkėjo atsakomybė yra užtikrinti teisingą ir atsakingą produkto pritaikymą. Naudoti tik esant pripažintam poreikiui. Neviršyti naudojimo normos.

NATURAMER RAPSOBOOST REKOMENDUOJAMAS KAI:

Pastebimas ar įtariamas boro ir molibdeno trūkumas, taip pat prevenciškai.

Reikia augalus apsaugoti ir paruošti juos artėjančiam abiotiniam (šaltis, karštis kt.) stresui.

Siekiama efektyviai sumažinti augalų stresą.

Yra nepalankios augalų augimo sąlygos.

Gerai supurtyti pakuotę prieš atidarant ir naudojant!

Rekomendacija naudojimui purškiant ant augalų lapų:

AUGALAI	TRĘSIMO BŪDAS	NORMOS
Rapsai	Prieš žydėjimą.	1,0-3,0 l/ha.
Daržovės	Po persodinimo, kai yra pakankamai lapijos – purkšti kas 2 savaites. Taip pat galima naudoti žydėjimo metu.	1,0-5,0 l/ha.
Cukriniai runkeliai	4-8 lapelių tarpsnyje ir kai uždengia vagas.	1,0-5,0 l/ha.
Žirniai, pupos, sojos	Prieš žydėjimą.	1,0-3,0 l/ha.

Jei reikia derinti trąšas su kitu produktu, pirmiausia padarykite bandomąjį abiejų medžiagų maišymą ir pažiūrėkite, kaip augalai reaguoja į tokį mišinį.

INFORMACIJA APIE SAUGĄ IR APLINKĄ:

Užtikrinti tinkamą vėdinimą. Saugoti nuo vaikų. Dėvėti apsauginius rūbus ir apsauginius akinius, mūvėti apsaugines pirštines. Laikytis higienos taisyklių. Prarijus: galimas gerklės dirginimas, kreiptis į gydytoją. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.

Daugiau informacijos rasite produkto saugos duomenų lape.

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS:

Sandėliavimo temperatūra turi būti nuo +5°C iki +30°C. Laikykite sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje. Skysčiui išsiliejus surinkti jį, o paviršių nuplauti vandeniu. Laikykite trąšas vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamose vietose.

GALIOJIMO LAIKAS:

2 metai nuo pagaminimo datos.

UFI: U5C0-G0JH-U005-GY37



GAMINTOJAS/MANUFACTURER:
UAB „BS CHEMICAL“ Briedžio g. 13,
Kretinga, Lietuva,
www.bs-chemical.lt
Tel.: +370 663 73748

Naturamer RapsoBoost

SEAWEED EXTRACT WITH BORON (B) AND MOLYBDENUM (MO)

For foliar fertilization

PFK: 1(B)(II) LIQUID ORGANO – MINERAL FERTILIZER
Declared amount of nutrients:

Dry matter		
(from 100% <i>Ascophyllum nodosum</i> natural extract)	3,0%	38,4 g/l
Total nitrogen (N)	3,6%	46,1 g/l
Organic nitrogen (N)	3,6%	46,1 g/l
Boras (B), as boron ethanolamine, water soluble	8,7%	111 g/l
Molybdenum (Mo), as sodium salt, water soluble	0,8%	10,1 g/l
Organic carbon (C org)	6,1%	78,1 g/l

The product also contains mannitol, organic compounds, polyphenols and alginates.

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

EN CONTENT:

CMC 1: Virgin material substances and mixtures: Boron ethanolamine (CAS No. 26038-87-9; EC No. 701-024-0), Sodium molybdate 2 – hydrate (CAS No. 12054-85-2, EC. No. 263-031-3), CMC 2: Plants, plant parts or plant extracts: cold pressed 100% natural *Ascophyllum nodosum* algae extract (CAS No. 84775-78-0).

The customer is responsible for the correct use of the product. Use only when necessary. Do not exceed the usage rate.

IT IS RECOMMENDED TO USE NATURAMER RAPSOBOOST WHEN:

Observed or suspected boron and molybdenum deficiency, also preventively.

It is necessary to protect plants and prepare them for upcoming abiotic (cold, heat, etc.) stress.

Aims to effectively reduce plant stress.

There are unfavorable conditions for plant growth.

Shake the contents well before use!

Recommendation for use when spraying on plant:

PLANTS	METHOD OF FERTILIZATION	USAGE RATES
Rapeseed	Before flowering.	1,0-3,0 l/ha.
Vegetables	After transplanting, when there is enough foliage - spray every 2 weeks. Can also be used during flowering.	1,0-5,0 l/ha.
Sugar Beets	At the 4-8 leaf stage and when the leaves cover the furrows.	1,0-5,0 l/ha.
Peas, beans, soy	Before flowering.	1,0-3,0 l/ha.

If it is necessary to combine the fertilizer with another product, first do a trial mixing of both materials and see how the plants react to such a mixture.

PRECAUTIONARY STATEMENT:

Ensure adequate ventilation. Keep out of the reach of children. Wear protective clothing and protective glasses, wear protective gloves. Follow hygiene rules. After swallowing: possible throat irritation, consult a doctor. In case of contact with eyes, immediately rinse well with water and consult a doctor.

For more information, see the product safety data sheet.

THE STORAGE CONDITIONS:

The storage temperature should be from +5°C till +30°C. Store in tightly closed original packaging. If the liquid is spilled, collect it and wash the surface with water. Keep fertilizers out of the reach of children and pets.

EXPIRY DATE:

2 years from the date of manufacture.

Pagaminimo data/
Manufacture date:

Partijos numeris/
Batch no:

Pakuotė/
Package: 5L