

S 800

KONCENTRUOTOS SIEROS TRĄŠOS - SUSPENSIIJA
CONCENTRATED SULPHUR FERTILISER - SUSPENSION



Naturamer
Naturing Growth, Naturally

5L

Naturamer S 800

KONCENTRUOTOS SIEROS TRĄŠOS - SUSPENSIIJA

PFK: 1(C)(I)(b) SKYSTOSIOS NEORGANINĖS MAKROELEMENTŲ TRĄŠOS

TIK PROFESIONALAMS

LT SUDEDAMOSIOS DALYS:

56 % sieros (800 g S/l) elementinės sieros pagrindu (CAS Nr. 7704-34-9, EC Nr. 231-722-6)(SMK 1: Cheminės medžiagos ir mišiniai iš grynųjų medžiagų).

Produktas sertifikuotas naudoti organinėje žemdirbystėje.

Skysta formulė, skirta tiesioginiam sieros tiekimui per lapus.

Derlingumo kokybei - siera spartina amino rūgščių, baltymų, fermentų ir vitaminų kaupimąsi augale.

Gerina augalų kokybę.

REKOMENDACIJOS NAUDOJIMUI:

Bendras naudojimas	Sieros trūkumo prevencijai ir atstatymui: 3-6 l/ha tręšiant per lapus su ne mažiau kaip 300 l vandens/ha. Naudojant kartu su kitais produktais, neviršyti 1 l Naturamer S 800 / 50 l vandens.
Rapsai	Aliejaus kiekiui augale padidinti: 1-2 tręšimai su 5 l/ha pradedant nuo 6 - lapelio stadijos iki žydėjimo pradžios.
Javai (kviečiai, miežiai, avižos, rugiai, soros, kukurūzai)	Sumažinti jautrumą miltligei: 1-2 tręšimai po 3 l/ha nuo daigų tarpsnio iki pieninės brandos tarpsnio.
Pupiniai augalai (žirniai, pupos, lubiniai, lęšiai, avinžirniai, soja, liucerna, pupelės)	1-2 tręšimai po 3-5 l/ha nuo daigų tarpsnio iki anksčių susidarymo tarpsnio.
Apyniai	Sieros trūkumo prevencijai ir atstatymui: keletas tręsimų su 0,2-0,4% tirpalu pagal poreikį.
Vynmedžiai	Daugiausiai 8 tręšimai: 3 - 4 l/ha tręšiant daigus (BBCH09). 4 l/ha žydėjimo metu (BBCH61) ir po žydėjimo (BBCH71). Kiti tręšimai likus 1 mėnesiui iki derliaus. Vandens kiekis: 200 - 1000 l/ha.

INFORMACIJA APIE SAUGĄ IR APLINKĄ:

Dirgina odą. Mūvēti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODO: plauti dideliu vandens kiekiu. Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS:

Laikyti sausoje, gerai ventiliuojamoje vietoje iki 30°C temperatūroje. Laikyti atokiai nuo maisto produktų, pašarų ir šėrimui naudojamų talpyklų, šilumos šaltinių ir atviros liepsnos. Saugoti nuo vaikų ir pašalinių asmenų.

GALIOJIMO LAIKAS:

2 metai nuo pagaminimo datos.

UFI: WTD0-30P2-N00K-2F5F

BS
CHEMICAL

GAMINTOJAS/MANUFACTURER:
UAB „BS CHEMICAL“ Briedžio g. 13,
Kretinga, Lietuva,
www.bs-chemical.lt
Tel.: +370 663 73748

Naturamer S 800

CONCENTRATED SULPHUR FERTILISER-

SUSPENSION

PFC: 1(C)(I)(b) LIQUID INORGANIC MACROELEMENT FERTILIZERS

FOR PRODESSIONAL USE ONLY

EN INGREDIENTS:

56 % sulphur (800 g S/l) based on micronized elemental sulphur (CAS No. 7704-34-9, EC No. 231-722-6)(CMC 1 : Virgin material substances and mixtures).

The product is certified for use in organic agriculture.

Liquid formulation for direct sulphur supply via the leaves.

For yield and quality - sulphur is used to build amino acids, proteins, enzymes and vitamins.

Raises oil content and feeding qualities.

RECOMMENDATIONS FOR USE:

General	To prevent and repair sulphur deficiency: several applications with 2-10 l/ha as a foliar application with at least 300 l water/ha. In case of application together with other products, do not exceed the amount of 1 l Naturamer S 800 per 50 l of water.
Rapeseed	For high oil contents: 1-2 applications with 5 l/ha from 6-leaf stage until beginning of blossom.
Cereal (wheat, barley, oats, rye, millet, corn)	To reduce susceptibility to mildew: 1-2 applications with 3 l/ha from beginning of tillering.
Bean plants (peas, broad beans, lentils, chickpeas, soya, alfalfa, beans)	1-2 fertilizations of 3-5 l/ha from the seedling stage to the pod formation stage.
Hop	To prevent and repair sulphur deficiency: several applications with 0,2-0,4% as needed.
Vine:	Maximum 8 applications: 3 - 4 l/ha from green sprout tops (BBCH09). 4 l/ha at blossom (BBCH61) and after blossom (BBCH71), further applications until one month before vintage. Water amount: 200 - 1000 l/ha.

PRECAUTIONARY STATEMENTS:

Causes skin irritation. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.

STORAGE CONDITIONS:

store in a dry, well-ventilated storage area at temperatures up to 30°C. Keep away from food articles, pellets and containers used for feeding, heat sources and naked flame. Keep away from children and unauthorized persons.

EXPIRY DATE:

2 years from the date of manufacture.

Pagaminimo data/
Manufacture date:

Partijos numeris/
Batch no:

Pakuotė/
Package: 5L

