

Tonic

SKYSTOS TRĄŠOS VAISIAMS, DARŽOVĖMS, DEKORATYVINIAMS AUGALAMS IR LAUKO KULTŪROMS
LIQUID FERTILIZER FOR FRUITS, VEGETABLES, ORNAMENTALS AND FIELD CROPS



Naturamer
Naturing Growth, Naturally

5 L

Naturamer Tonic

SKYSTOS TRĄŠOS VAISIAMS, DARŽOVĖMS, DEKORATYVINIAMS AUGALAMS IR LAUKO KULTŪROMS

SUDĖTIS:	% m/m	g/l
Laisvosios aminorūgštys	16,6	202,5
Sacharidai	5,7	69,5
Organinės medžiagos	50	610

TIK PROFESIONALAMS

LT SUDEDAMOSIOS DALYS:

Produktas pagamintas naudojant augalinės kilmės žaliavas. Dėl savo sudėties ir gamybos technologijos jis pasižymi daugybe naudingų savybių augalams: Suteikia augalams energijos – palaiko optimalų augimo intensyvumą ir augalo gyvybingumą. Sudėtyje yra aminorūgščių ir sacharidų, kurie mažina streso poveikį augalams. Gerina derliaus kokybę. Pagerina maisto medžiagų pasisavinimą dėl didelio organinių medžiagų kiekio.

SUDERINAMUMAS:

Pirkėjas yra atsakingas už teisingą ir atsakingą gaminio naudojimą. Naudokite tik tada, kai yra pripažintas poreikis. Neviršykite naudojimo normos. Jei reikia derinti trąšas su kitu produktu, pirmiausia padarykite bandomąjį abiejų medžiagų mišinį ir pažiūrėkite, kaip augalai reaguoja į tokį mišinį.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS:

Tręšimas purškiant per lapus : 200-300ml produkto į 100L vandens.

Fertigacinis purškimas: 5-10L/ha

Reabilitacinis purškimas (po streso ar augalo pažeidimų): 20L/ha

Prieš naudojimą gerai suplakti produktą!

DERLIUS	TRĘŠIMO REKOMENDACIJOS
Šiltnaminės daržovės	Tręšti viso augalo augimo ciklo metu kas 7–14 dienų.
Daržovės	Lapinės daržovės: Reguliariai tręšti ankstyvose augimo stadijose. Vaisinės daržovės ir skintos gėlės: Tręšti 4–6 kartus nuo augimo pradžios, atsižvelgiant į stresą ir augimo raidą.
Braškės	Tręšti 6–8 L/ha reguliariai visą vegetacijos laikotarpį.
Mėlynės ir spanguolės	Tręšti 10 L/ha tris kartus: pumpuravimo, vaisių mezgimo ir vaisių didėjimo metu.
Orchidėjos, citrusiniai, subtropiniai augalai ir alyvmedžiai	Tręšti pumpurų sprogimo, žydėjimo pradžios ir vaisių mezgimo pabaigos metu. Taip pat naudoti esant augalų stresui.
Vynmedžiai	Tręšti vegetacijos metu. Kartoti 2–3 kartus nuo uogų susiformavimo iki brandimo pradžios.
Javai	Mažiausia dozė – 4 L/ha vieną kartą. Gali būti maišoma su herbicidais. Vasariniams javams tręšti praėjus 35–40 dienų po sėjos.

Tręšimas produktu **Naturamer Tonic** yra ypač veiksmingas dėl didelio organinių medžiagų kiekio, kuris gerina dirvožemį.

Purškstuvo talpą pripildykite vandeniu iki pusės. Įpilkite reikiamą kiekį **Naturamer Tonic**. Gerai išmaišykite ir pripildykite likusia dalimi vandens iki pilno purškstuvo. Purškiant palaikykite pastovų mišinį, kad tirpalas būtų vienalytis. Naudokite tuo paros metu, kai nėra tiesioginių saulės spindulių (ryte arba vakare).

INFORMACIJA APIE SAUGĄ IR APLINKĄ:

Nemaišykite su pesticidais ar kitomis cheminėmis medžiagomis be išankstinio suderinamumo patikrinimo. Nemaišykite su siera ar variu, išskyrus alyvmedžių tręšimą ir tik esant techninei priežiūrai. Nemaišykite su mineraliniais aliejais bei produktais, kurie savo sudėtyje turi vandenilio peroksido arba chloridų – jie sumažins produkto veiksmingumą. Nenuiryt. Venkite įkvėpimo, patekimo į akis ir ant odos. Prieš naudojimą perskaitykite produkto saugos duomenų lapus. Naudodami produktą dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius, apsauginius akinius ir pirštines.

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS:

Laikyti originalioje pakuotėje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių. Laikymo temperatūra turi būti nuo +5°C iki +30°C. Saugokite gaminį nuo užšalimo. Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje. Nelaikykite produkto tiesioginiuose saulės spinduliuose arba šalia tiesioginių šilumos šaltinių. Trąšas laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

GALIOJIMO LAIKAS:

1 metai nuo pagaminimo datos.

BS
CHEMICAL

GAMINTOJAS/MANUFACTURER:
UAB „BS CHEMICAL“ Briedžio g. 13,
Kretinga, Lietuva,
www.bs-chemical.lt
Tel.: +370 663 73748

Naturamer Tonic

LIQUID FERTILIZER FOR FRUITS, VEGETABLES, ORNAMENTALS AND FIELD CROPS

COMPOSITION:	% w/w	g/l
Free amino acids	16,6	202,5
Saccharides	5,7	69,5
Organic matter	50	610

FOR PRODESSIONAL USE ONLY

EN PRODUCT DESCRIPTION:

The product is made using plant-based raw materials. Due to its composition and production technology, it has many beneficial properties for plants: Provides energy to plants – supports optimal growth intensity and plant vitality. Contains amino acids and sugars, which reduce stress impact on plants. Improves crop quality. Enhances nutrient absorption due to the high content of organic substances.

COMPATIBILITY:

It is the buyer's responsibility to ensure correct and responsible application of the product. Use only when there is a recognized need. Do not exceed the usage rate. If it is necessary to combine the fertilizer with another product, first do a trial mixing of both materials and see how the plants react to such a mixture.

DIRECTIONS FOR USE:

Foliar fertilization: 200-300ml/100L water

Fertigation: 5-10L/ha

Rehabilitation: 20L/ha

Always shake well contents before use!

CROPS	APPLICATION
Greenhouse vegetables	Apply throughout the entire crop cycle every 7-14 days.
Vegetables	Leafy vegetables: apply regularly during early growth stages. Fruiting Vegetables and cut flowers: apply 4-6 times from the start of crop, depending on stress and development.
Strawberries	Apply 6–8 L/ha regularly throughout the entire crop lifecycle.
Blueberries and Cranberries	Apply 10 L/ha three times: during budding, fruit setting, and fruit sizing.
Orchards, Citrus, Subtropical and Olive Trees	Apply at bud break, pre-bloom, and once fruit setting is complete. Also apply when crops are under stress.
Vines	Apply during vegetative growth. Repeat 2–3 times from post-berry set until ripening begins.
Cereals	Minimum dose: 4 L/ha once. Can be mixed with herbicides. For summer cereals, apply 35–40 days after seeding.

Irrigation with **Naturamer Tonic** is especially effective due to its high organic matter content, which enhances soil health. For more recommendations contact your distributor.

Fill the sprayer tank halfway with water. Add the required **Naturamer Tonic**. Mix well to ensure a uniform solution. Fill the rest of the tank with water to reach the full volume. Maintain constant agitation during spraying to keep the solution homogeneous. Apply early in the morning or in the evening, avoid direct sunlight.

PRECAUTIONARY STATEMENTS:

Do not mix with pesticides or any other chemicals without compatibility testing. Do not mix with sulfur or copper except in olive trees application with technical supervision. Do not mix with mineral oils and do not use together with products based on hydrogen peroxide or chlorides as they will diminish the effect. Do not swallow. Avoid inhalation and contact with eyes and skin. Read the product safety data sheet before use. Wear protective clothing, safety glasses and gloves when using this product.

STORAGE CONDITIONS:

Store in original container away from direct sunlight. The storage temperature should be between +5°C and +30°C. Protect the product from freezing. Store in tightly closed original packaging. Do not store the product in direct sunlight or near direct heat sources. Keep fertilizers out of the reach of children and pets.

EXPIRY DATE:

1 year from the date of manufacture.

**Pagaminimo data/
Manufacture date:**

**Partijos numeris/
Batch no:**

**Pakuotė/
Package:** 5L